

FITXA I PLA D'ACCIÓ EN AL·LÈRGIA A ALIMENTS



Els infants amb diverses al·lèrgies poden necessitar un full per aliment.
No tots els aliments produeixen els mateixos símptomes.

Nom:.....
Al·lèrgic/ca a:.....
Aula:..... Tutor/ra de l'aula:.....


RECORDA: Els símptomes d'al·lèrgia es poden produir entre pocs minuts i 1 h després de prendre l'aliment, i inclouen:

ORGAN	SÍMPTOMES
Boca	Picor, inflor de llavis i/o de la llengua
Gola i rinofaringe*	Picor o sensació d'una bolla a la gola; ronquera, tos espasmòdica, picor brusca d'oïda, esternuts en sèrie i mucositat abundant, com aigua.
Pell	Envermelliment, picor, urticària amb faves, inflor de cara o extremitats.
Aparell digestiu	Dolor abdominal, nàusees, vòmits, diarrea.
Aparell respiratori*	Tos espasmòdica, asma, opressió o dolor al tòrax.
Aparell circulatori	Mareig, taquicàrdia, pols dèbil, desmai, desmanegament.

La severitat dels símptomes pot canviar. *Aquests símptomes poden progressar a afectació greu, ANAFILAXI.

L'infant és asmàtic: SÍ = risc augmentat NO

PLA D'ACCIÓ, INGESTIÓ O CONTACTE AMB UN ALIMENT EN UN INFANT AL·LÈRGIC



Autorització dels pares (firma)

Autorització del metge o de la metgessa

FITXA I PLA D'ACCIÓ EN AL·LÈRGIA A ALIMENTS



Els infants amb diverses al·lèrgies poden necessitar un full per aliment.
No tots els aliments produeixen els mateixos símptomes.

Nom:.....
Al·lèrgic/ca a:.....
Aula:..... Tutor/ra de l'aula:.....

RECORDA: Els símptomes d'al·lèrgia es poden produir entre pocs minuts i 1 h després de prendre l'aliment, i inclouen:


ÒRGAN	SÍMPTOMES
Boca	Picor, inflor de llavis i/o de la llengua
Gola i rinofaringe*	Picor o sensació d'una bolla a la gola; ronquera, tos espasmòdica, picor brusca d'oïda, esternuts en sèrie i mucositat abundant, com aigua.
Pell	Envermelliment, picor, urticària amb faves, inflor de cara o extremitats.
Aparell digestiu	Dolor abdominal, nàusees, vòmits, diarrea.
Aparell respiratori*	Tos espasmòdica, asma, opressió o dolor al tòrax.
Aparell circulatori	Mareig, taquicàrdia, pols dèbil, desmai, desmanegament.

La severitat dels símptomes pot canviar. *Aquests símptomes poden progressar a afectació greu, ANAFILAXI.

L'infant és asmàtic: SÍ = risc augmentat

NO

PLA D'ACCIÓ, INGESTIÓ O CONTACTE AMB UN ALIMENT EN UN INFANT AL·LÈRGIC



Autorització dels pares (firma)

Autorització del metge o de la metgessa